

Dávkovací tabulka

Terapeutické indikace přípravku APOQUEL[®]:

- Léčba pruritu spojeného s alergickou dermatitidou u psů.
- Léčba klinické manifestace atopické dermatitidy u psů.



Dávkování a schéma léčby přípravkem APOQUEL[®]:

- Úvodní dávka APOQUELU je 0,4 až 0,6 mg/kg dvakrát denně orálně až po dobu 14 dní.
- V rámci udržovací terapie se stejné množství podává jednou denně.
- Tablety přípravku APOQUEL[®] lze podávat s malým množstvím krmiva nebo nalačno.
- Délku léčby tabletami APOQUEL[®] můžeme přizpůsobit podle primárního onemocnění a intenzity pruritu.

Hmotnost psa (kg)	SÍLA A POČET TABLET URČENÝCH K PODÁVÁNÍ		
	APOQUEL [®] tablety 3,6 mg	APOQUEL [®] tablety 5,4 mg	APOQUEL [®] tablety 16 mg
3,0 – 4,4	1/2		
4,5 – 5,9		1/2	
6,0 – 8,9	1		
9,0 – 13,4		1	
13,5 – 19,9			1/2
20,0 – 26,9		2	
27,0 – 39,9			1
40,0 – 54,9			1 1/2
55,0 – 80,0			2

Pro kompletní informace o přípravku čtěte aktuální souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci. V případě dotazů k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis.



APOQUEL[®] má dvě terapeutické indikace

- Léčba pruritu spojeného s alergickou dermatitidou u psů
- Léčba klinické manifestace atopické dermatitidy u psů

APOQUEL[®] znamená jednoduchý způsob léčby

- Přípravek umožňuje zahájení terapie spolu s provedením alergického testu (na rozdíl od prednisolonu nedochází k žádné interferenci s výsledky kožních testů) nebo odběrem vzorků na serologické vyšetření⁴
- Během podávání přípravku je možno psy vakcinovat

APOQUEL[®] lze bezpečně použít v kombinaci s běžně podávanými léky

- Jako jsou endo- a ektoparazitika, antibiotika nebo protizánětlivé přípravky

- **RYCHLÁ ÚLEVA** - prokázaný antipruritický účinek během 4 hodin po podání¹
- **DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ** - trvalá úleva od pocitu svědění a potlačení kožních změn²
- **DOBŘE TOLEROVANÝ** - bez nežádoucích účinků glukokortikoidů, s unikátním mechanismem účinku³
- **POHODLNÝ** - dělitelné tablety, jež se snadno aplikují s krmivem nebo samostatně

Reference:

1. Cosgrove SB et al. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with canine allergic dermatitis. *Vet Dermatol.* 2013 doi: 10.1111/vde.12047. **2.** Cosgrove SB, et al. *Vet Dermatol.* 2013; in press. **3.** Data on file. Zoetis study 5962C-85-08-364. **4.** Aleo MM, et al. Abstract presented at NAVDF 2013 Louisville.



- Přípravek je k dispozici ve třech různých silách
- Na trhu jsou balení s 20 nebo 50 tabletami

APQ-2014-01.002