

## **APOQUEL<sup>®</sup>:**

- S lékem **APOQUEL<sup>®</sup>** (oclacitinib), Vám Zoetis nabízí novou možnost cílené léčby svědění, která rychle přeruší bludný kruh pruritu a zánětu spojený s alergickými kožními nemocemi a pomáhá zlepšit kožní léze u léčených psů.
- Evropská komise povolila registraci léku APOQUEL<sup>®</sup> v září 2013.

## **APOQUEL<sup>®</sup> Indikace:**

- **APOQUEL<sup>®</sup>** je orální inhibitor Jánus Kinázy (JAK), indikovaný k léčbě pruritu spojeného s alergickou dermatitidou a léčbě klinické manifestace atopické dermatitidy u psů starších 12 měsíců s živou hmotností větší než 3 kg.

## **APOQUEL<sup>®</sup> Základní vlastnosti:**

- **APOQUEL<sup>®</sup>** je jediný veterinární lék, specificky vyvinut a schválen k léčbě pruritu spojeného s alergickou dermatitidou a léčbě klinické manifestace atopické dermatitidy u psů.
- **APOQUEL<sup>®</sup>** prokázal v laboratorních studiích potlačení pruritu již po 1 až 3 hodinách po podání první dávky.<sup>1</sup>
- V klinické studii trvající 1 měsíc, **APOQUEL<sup>®</sup>** prokázal efektivní kontrolu pruritu po 4 hodinách po podání u psů s alergickou dermatitidou.<sup>2</sup>
- V klinické studii trvající 4 měsíce, **APOQUEL<sup>®</sup>** prokázal dlouhodobou úlevu od pruritu a zlepšení kožních lézí se sporadickým výskytem nežádoucích účinků u psů s atopickou dermatitidou.<sup>3</sup>
- **APOQUEL<sup>®</sup>** specificky inhibuje pruritogenní i zánětlivou signální cestu zodpovědnou za svědění a poskytuje úlevu bez klasických krátkodobých i dlouhodobých negativních účinků glukokortikoidů.
- Riziko metabolických lékových interakcí je velmi nízké a **APOQUEL<sup>®</sup>** byl bezpečně použit s jinými běžnými léky jako např. endo- a ektoparazitiky, antibiotiky a antiflogistiky.
- Zvířata mohou být vakcinována pokud jsou souběžně léčena přípravkem **APOQUEL<sup>®</sup>**.
- V klinických studiích, léčba přípravkem **APOQUEL<sup>®</sup>** neinterferovala s intradermálními kožními alergickými testy, což v porovnání s prednisolonem umožňuje začít terapii pruritu před identifikací alergenů.<sup>4</sup>
- **APOQUEL<sup>®</sup>** tedy poskytuje rychlou úlevu od pruritu a umožní veterinárním lékařům soustředit se na diagnostiku primární příčiny svědění.

## **APOQUEL<sup>®</sup> dávkování:**

- **APOQUEL<sup>®</sup>** tablety se podávají v dávce 0,4 – 0,6 mg/kg perorálně, prvních 14 dní 2x denně, poté 1x denně jako udržovací terapie.
- **APOQUEL<sup>®</sup>** tablety je možné podávat s krmením nebo nalačno.

## **APOQUEL<sup>®</sup> bezpečnost:**

**APOQUEL<sup>®</sup>** by neměl být použit u psů mladších 12 měsíců s hmotností pod 3 kg. **APOQUEL<sup>®</sup>** je kontraindikován u psů s imunosupresí nebo s maligní neoplazií, jelikož účinná látka nebyla v uvedených situacích vyzkoušena. **APOQUEL<sup>®</sup>** ovlivňuje imunitní systém a může způsobovat zvýšenou vnímavost k infekcím nebo exacerbovat neoplazie. Bezpečnost přípravku **APOQUEL<sup>®</sup>** nebyla stanovena u gravidních a laktujících fen a u chovných psů, proto se jeho použití u těchto zvířat nedoporučuje. Při léčbě svědění je potřeba diagnostikovat a léčit primární příčinu pruritu, stejně jako komplikující faktory atopické dermatitidy jako bakteriální, mykotické nebo parazitární infekce/infestace. Nejčastější nežádoucí účinky při léčbě přípravkem **APOQUEL<sup>®</sup>** bylo zvracení a průjem. Ostatní nežádoucí účinky zahrnovaly letargii, snížený apetit nebo inapetenci, kožní nebo ušní iritaci nebo infekci. Je doporučeno pravidelné monitorování krevního obrazu a biochemického profilu.

## **Reference:**

1. Data on file. Zoetis study A161-AU-12-096.
2. Cosgrove SB, et al. Vet Dermatol. 2013; in press.
3. Fleck T, et al. Abstract presented at 2. NAVDF 2013 Louisville, USA.
4. Aleo MM, et al. Abstract presented at NAVDF 2013 Louisville, USA.

Pro kompletní informace o přípravku čtěte aktuální souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci.  
V případě dotazů k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis.

**Zoetis Česká republika, s.r.o.**, Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5  
tel.: 257 101 111, fax: 257 101 101, e-mail: infovet.cz@zoetis.com

**Zoetis Luxembourg Holding SARL, organizačná zložka**, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava  
tel.: +421 2 5939 6190, e-mail: infovet.cz@zoetis.com

**PRO ZVÍŘATA. PRO ZDRAVÍ. PRO VÁS.**

**zoetis**<sup>™</sup>